



# Clipless® NT Tillväxtregulator

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar

## GRÄS

REGISTRERINGSNUMMER	5320
VERKSAMT ÄMNE	120 g/l trinexapak (etyl-ester)
FORMULERING	Mikroemulsion
BEHÖRIGHETSKLASS	2L
INNEHÅLL	5 L

### ANVÄNDNINGSVILLKOR

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar.

För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". De anvisningar som gäller bestämning av skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 (kommentarer till 5-6§§ i SNFS 97:2) ska iakttas.

### VERKNINGSSÄTT

Clipless® NT med den aktiva substansen trinexapak (etyl-ester) stoppar tillfälligt produktion av gibberelinsyra, detta tillväxthormon påverkar plantans höjdtillväxt. Detta innebär en nedsättning av plantcellens längdtillväxt, och plantans höjdtillväxt minskas. Trinexapak (etyl-ester) verkar systemiskt i plantan.

### ANVISNINGAR OM ANVÄNDNING

#### Optimala betingelser

Behandling skall endast ske på grödor i god tillväxt. Optimal behandlingstemperatur är från och med 10 °C.

#### Regn

Clipless® NT är regnfast efter 6 timmar.

#### Rekommendation

Behandling kan ske vid tillväxtens början på våren.

Flera behandlingar görs under säsongen för att uppnå en bra effekt.

Behandla ytor med god grästillsväxt.

Vid svag grästillsväxt, reducera dosering.

Vid rekommenderad dosering, på klippning över 12 mm sker en reduktion av gräsklipp med upp till 50% samt en reduktion av gräshöjd upp till 20%. Denna effekt minskar vid klippning under 6 mm.

Doseringar i tabellen nästa sida får ej överskridas.



Clipless® is trademark of FMC Corporation or an affiliate.

GRÄSTYP	MAX ANTAL BEHANDLINGAR PER SÄSONG (INTERVALL)	DOSERING L/HA	MAX DOS PER SÄSONG	ANMÄRKNINGAR
Green på golfbaner	24 (7-28 dagar)	0,2-0,4 l/ha	9,6 l/ha	
Tee och fairway på golfbanor	6-10 (14-28 dagar)	0,8-2,4 l/ha	16,0 l/ha	1,6 l/ha ( <i>Agrotis, poa, Festuca</i> ) 2,4 l/ha ( <i>Lolium</i> )
Ruff och semi-ruff på golfbanor samt andra gräsbevuxna idrottsanläggningar	5-6 (14-28 dagar)	1,2-3,2 l/ha	16,0 l/ha	2,4 l/ha ( <i>Agrotis, poa, Festuca</i> ) 3,2 l/ha ( <i>Lolium</i> )

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar användas.

Ät inte eller drick inte under hanteringen.

#### Behandlingsrestriktioner

- Behandla ej på stressat gräs. Stress kan bero på vattenmättnad, torka, svamp/skadedjurs angrepp, näringsbrist eller kallt väder.
- Gräset kan se mörkare ut efter en behandling jmf. med ej behandlat.
- Behandling kan ge en temporär gulfärgning av gräset. Denna försvinner normalt inom en vecka.
- Grässets art sammansättning och ev. uttunning på längre sikt är ej undersökt. Vid den högsta dosen på 3,2l/ha kan en övergående uttunning av gräs ske.
- För att undgå ev. missfärgning bör Clipless® NT appliceras minst 4 tim. före klippning. Alternativt, klippa först och sedan vänta 24 timar med behandling.
- Uppsamlad gräs får ej användas som kompost.
- Behandling avråds på nysått gräs, behandling kan ske först vid 80-90% marktäckning med gräs.



SKANNA FÖR ATT FINNA ETIKETT OCH  
SÄKERHETSATABLAD PÅ [FMCAGRO.SE](http://FMCAGRO.SE)