



# VERIMARK®

Insektsmedel för användning i växthusodlade grönsaker och jordgubbar

IRAC GRUPP

28

INSEKTSMEDEL

Registreringsnummer: 6047. Behörighetsklass: 2  
Endast för yrkesmässigt bruk

### Användningsområde:

Mot skadeseelter i växthusodlingar av gurkväxter med ättlig skal, gurkväxter med oätlig skal, jordgubbar, färska bönor med balja, sallat och sallatsväxter, paprikor, tomat och äggplanta/aubergine. Får endast användas i växthus med slutet, recirkulerande system. Får endast appliceras via droppbevattning. Behandling får ej ske senare än 1 dag före skörd.

All annan användning är o tillåten om den inte särskilt tillåts.  
Läs medföljande anvisningar före användning.

**Verksamma beståndsdelar: Cyantraniliprol® 200 g/l (18,73% w/w)**  
**Formulering: Suspensionskoncentrat (SC)**

Skydda mot frost, värme och fukt  
ÅTERANVÄNDNING AV FÖRPACKNINGAR ÄR FÖRBUDEN

<sup>(4)</sup> Registrerat namn Cyazypyr®  
Verimark, Cyazypyr, All Clear and FMC are registered trademarks of FMC Corporation and/or one of its subsidiaries.  
© Copyright 2022 - 2022 FMC Corporation. All rights reserved.

### Innehavare av godkännandet

FMC France, 11 Bis Quai Perrache, 69002 Lyon, Frankrike

### Importör och distributör:

FMC Agricultural Solutions A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Danmark  
Tél. +45 96909690, [www.fmcagro.se](http://www.fmcagro.se)

Nettoinnehåll: **500ml**

### FÖRSTA HJÄLPEN

**Vid hudkontakt:** Ta omedelbart av alla förorenade kläder eller skor; skölj huden omedelbart noga med vatten. Tvätta med tvål och mycket vatten. Vid hudirritation, utslag eller allergiska reaktioner, kontakta en läkare. Tvätta förorenade kläder innan de används igen.

**Vid stänk i ögonen:** Skölj omedelbart och försiktigt i 15 till 20 minuter under rinnande vatten med ögonlocken öppna. Skydda det oskadade ögat. Ta ut kontaktlinser efter några minuter (om möjligt utan svårighet) och skölj igen. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

**Vid inandning:** Flytta omedelbart den utsatta personen ut i friska luften. Rådfråga en läkare efter all exponering. Vid medvetlöshet, lägg personen i stabilt sidoläge och kontakta läkare. Vid andningsbesvär, kontakta omedelbart akutsjukvården: 112 eller giftinformationscentralen.

**Vid förtäring:** Kontakta omedelbart 112 eller giftinformationscentralen. Framkalla INTE kräkning utan läkares inrådan. Se till att andningsvägarna är fria. Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker. Skölj munnen med vatten om personen är vid medvetande. Ge aldrig något via munnen till en medvetlös person. Om kräkningar inträffar, skölj munnen igen.

I samtliga fall, om symtomen kvarstår eller om du känner dig dålig, sök läkarvård och visa etiketten och/eller säkerhetsdatabladet.

### VARNING

UFI: 8Y4X-12CH-DN4A-TW3E

**H410** Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter **P391** Samla upp spill. **P501** Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.

**EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion**

**EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.**

**SP 1** Förorena inte vattnet med produkten eller dess förpackning. Rengör inte appliceringsutrustning nära vattendrag eller ytvatten. Undvik förorening genom avloppssystem från gårdsplaner eller vägar. **SP 2** För att skydda vattenlevande organismer, släpp inte ut spillvatten från växthus direkt i ytvatten.



### Användningsvillkor:

Aterinrädesperiod (DRE): 24 timmar efter behandling.

För användning i växthus. Kan vara skadligt för pollinerande insekter och nyttodjur. För att skydda bin får inte behandlade växter planteras utanför odlingsutrymmet.

För information om personlig skyddsutrustning (PPE), se avsnittet «Skydd för operatörer och arbetare» på etiketten.

Undvik all onödig exponering.

För andra användningsvillkor, se insidan av etiketten.

**Vid olycksfall: Vid nödfall ring 112 och begär giftinformationscentralen. Vid mindre brådska fall ring 010-456 67 00, 24 timmars-service**



**Batchnummer och produktionsdatum:**  
se förpackningen  
**Hållbarhet:** 3 år efter produktionsdatum

11016904\_22067340\_SWEDEN

190:185 x 95 - 11016904\_22067340\_LBL\_ML-F\_500ML\_VERIMARK\_SE\_1\_BOOKLET\_8pages.indd 1

13-10-2025 10:13

P 032C P 2408C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

|                                | FILL IN                      |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | SWEDEN                       | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11016904                     | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | VERIMARK_500ML_SE            | Booklet                   | 190/185 x 95 mm  |
| Label SKU                      | 22067340                     | Number of pages (Booklet) | 8 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-F_500ML_VERIMARK_SE_1 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) |                              | Preprinted Material       |                  |

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Särskilda villkor ska följas vid användning av växtskyddsmedel. Villkoren framgår av Kemikalieinspektionens godkännande av medlet och är grundande på medlets hälso- och miljörisker samt god jordbrukarsed. Verimark® är godkänd för användning mot skadeinsekter enligt nedanstående tabell. Observera att hela bruksanvisningen för produkten ska följas.

| Gröda                                   | Syfte              | Metod             | Tidpunkt /<br>Utv.stadium | Max antal<br>behandlingar | Intervall<br>(dagar) | Karenstid<br>(dagar) | Max dos per<br>behandling (mL/ha) |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Gurkväxter med ätligt skal i växthus    | Mot insektsangrepp | I droppbevattning | BBCH 12-89                | 4 per år                  | 7                    | 1                    | 500 mL/ha                         |
| Gurkväxter med oätligt skal i växthus   | Mot insektsangrepp | I droppbevattning | BBCH 12-89                | 4 per år                  | 7                    | 1                    | 500 mL/ha                         |
| Jordgubbar i växthus                    | Mot insektsangrepp | I droppbevattning | BBCH 12-89                | 4 per år                  | 7                    | 1                    | 375 mL/ha                         |
| Färska bönor med balja i växthus        | Mot insektsangrepp | I droppbevattning | BBCH 12-89                | 2 per år                  | 7                    | 1                    | 500 mL/ha                         |
| Sallat och sallatsväxter i växthus      | Mot insektsangrepp | I droppbevattning | BBCH 12-89                | 3 per odlingskultur*      | 7                    | 1                    | 500 mL/ha                         |
| Paprikor i växthus                      | Mot insektsangrepp | I droppbevattning | BBCH 12-89                | 4 per år                  | 7                    | 1                    | 500 mL/ha                         |
| Tomat och äggplanta/ aubergin i växthus | Mot insektsangrepp | I droppbevattning | BBCH 12-89                | 4 per år                  | 7                    | 1                    | 500 mL/ha                         |

\* Totala maximala dosen i sallat och sallatsväxter får inte överskrida 300 g cyantraniliprol/ha och år. Det motsvarar maximalt 1500 mL Verimark® per ha och år.

Övriga villkor

**Återinträde i utrymmen där droppbevattning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling.**

Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt förordning (EG) nr 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.

Produkten får endast användas i odlingsystem där odlingsvatten samlas upp och recirkuleras i ett tätt system för att undvika att växtskyddsmedel läcker till grundvatten och omgivande miljö.

För att skydda bin får inte behandlade växter planteras utanför odlingsutrymmet.



|                                | FILL IN                      |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | SWEDEN                       | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11016904                     | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | VERIMARK_500ML_SE            | Booklet                   | 190/185 x 95 mm  |
| Label SKU                      | 22067340                     | Number of pages (Booklet) | 8 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-F_500ML_VERIMARK_SE_1 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) |                              | Preprinted Material       |                  |

Föriktighetsåtgärder vid användning

Verimark® ska användas i en lösning med ett pH-värde under 7. Optimalt pH-värde är 5-6. Om pH-värdet i vattnet som används är högre, rekommenderas att använda ett surhetsreglerande medel för att sänka pH-värdet.

BRUKSANVISNING

Verkningssätt

Verimark® är ett insektsmedel innehållande cyantraniliprol (Cyazypyr®). Cyazypyr® tillhör gruppen diamider (IRAC-grupp 28: ryanodinreceptormodulatorer), och har ett nytt verknings sätt mot bitande och sugande skadegörare.

Cyazypyr® tas upp via rötterna och transporteras genom xylemet ut till blad och frukter. Effekten är huvudsakligen på icke-jordlevande skadegörare, både vuxna och larver, genom födointag.

Cyazypyr® binder till ryanodinreceptorer i insekternas muskelceller och verkar genom att tömma kalciumförrådet i dessa. Detta leder till okontrollerade muskelkontraktioner, förlamning och därefter död. Förlamningen inträffar efter några timmars exponering, vilket gör att skadegöraren slutar äta på grödan. Insekten dör generellt 3 till 6 dagar efter exponering. Behandling med Verimark skyddar grödan i 15-21 dagar.

Resistensrisk

Cyantraniliprol tillhör gruppen diamider (IRAC-grupp 28: ryanodinreceptormodulatorer). För att förebygga utveckling av resistens bör denna produkt användas som en del av ett integrerat växtskydd (IPM), se nedan.

När insekticider med samma verknings sätt används år efter år, i flera säsonger på samma fält och mot samma skadegörare, kan de mindre känsliga individerna överleva, utvecklas och bli dominerande. En skadegörare anses vara resistent eller mindre känslig mot ett insektsmedel om den överlever en korrekt utförd behandling, med den rekommenderade dosen och tidpunkten, och under normala klimatförhållanden.

För att undvika att resistens uppstår är det viktigt att följa dessa rekommendationer:

- Använd Verimark® som en del i en strategi där produkter med olika verknings sätt ingår.
- Övervaka inflygning och utveckling av skadegörarpopulationen och behandla vid överskriden skadetröskel.
- Följ bruksanvisningen på denna etikett angående dosering, intervall mellan behandlingar och behandlingstidpunkt.

Stäm av rekommendationer om resistenshantering med din rådgivare och följ IRAC's riktlinjer för användning av diamider ([www.irac-online.org](http://www.irac-online.org)).

Integrerat växtskydd

FMC stödjer Integrerat växtskydd (IPM). Verimark® kan användas som en del av ett IPM-program tillsammans med andra metoder. Principerna och metoderna för IPM inkluderar förebyggande åtgärder, monitorering och identifiering av insektspopulationer, användning av insektsmedel med olika verkningsmekanismer, och en genomtänkt bekämpning baserad på den aktuella skadegöraren och dess skadetröskel. Vid insättande av nyttoorganismer eller pollinerare i växthus, konsultera leverantören av dessa nyttoorganismer eller pollinerare om vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas.

Rekommendationer för användning

Rekommendationerna är framtagna genom fältförsök med normal variation av yttre betingelser. Följ alltid rekommendationerna nedan.

Gurkväxter med åtligt skal (slanggurka, druvgurka, squash/zucchini och övriga gurkväxter med åtligt skal)

Gurkväxter med oätligt skal (melon, vattenmelon, pumpa och övriga gurkväxter med oätligt skal)

Tomat och äggplanta/ aubergin

Paprika och chili



|                                | FILL IN                      |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | SWEDEN                       | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11016904                     | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | VERIMARK_500ML_SE            | Booklet                   | 190/185 x 95 mm  |
| Label SKU                      | 22067340                     | Number of pages (Booklet) | 8 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-F_500ML_VERIMARK_SE_1 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) |                              | Preprinted Material       |                  |

| Skadegörare                                                                                                                                 | Dos                                                                  | Användningstidpunkt (BBCH)                                          | Antal behandlingar                        | Karenstid | Övriga villkor                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Vita flygare <sup>1</sup><br>Frilevande fjärilslarver <sup>2</sup><br>Minerarflugor <sup>3</sup><br>Löss <sup>4</sup><br>Trips <sup>5</sup> | Från 375 mL upp till 500 mL/ha beroende på grödans tillväxthastighet | Från BBCH 12 (från 2 örtblad) till BBCH 89 (alla frukter är mogna). | Max 4 per år med minst 7 dagars intervall | 1 dag     | Endast i droppbevattning. Endast i växthus med slutet, recirkulerande system. |

<sup>1</sup> *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*  
<sup>2</sup> *Autographa gamma*, *Chrysodeixis chalcites*, *Helicoverpa armigera*, *Spodoptera exigua*, *Spodoptera littoralis*, *Mamestra* sp., *Diaphania indica*  
<sup>3</sup> *Liriomyza* sp.  
<sup>4</sup> *Aphis gossypii*  
<sup>5</sup> *Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*

Vita flygare, minerarflugor, löss, trips:  
För att få bäst effekt av Verimark® ska behandlingen göras så snart de första skadegörarna upptäcks på grödan, innan de första skadorna på blad eller frukter syns. Upprepa efter 7 till 10 dagar beroende på skadegörartrycket.

Frilevande fjärilslarver:  
För att få bäst effekt av Verimark® rekommenderas det att göra en förebyggande behandling vid begynnande äggläggning, innan äggen kläcks och innan de första skadorna kan ses på blad och frukter. Upprepa efter 7 till 10 dagar beroende på skadegörartrycket.

**Jordgubbar**

| Skadegörare                                                                                                 | Dos       | Användningstidpunkt (BBCH)                                          | Antal behandlingar                        | Karenstid | Övriga villkor                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Frilevande fjärilslarver <sup>2</sup><br>Löss <sup>4</sup><br>Trips <sup>5</sup><br>Skalbaggar <sup>6</sup> | 375 mL/ha | Från BBCH 12 (från 2 örtblad) till BBCH 89 (alla frukter är mogna). | Max 4 per år med minst 7 dagars intervall | 1 dag     | Endast i droppbevattning. Endast i växthus med slutet, recirkulerande system. |

<sup>2</sup> *Autographa gamma*, *Chrysodeixis chalcites*, *Helicoverpa armigera*, *Spodoptera exigua*, *Lacanobia oleracea*, *Mamestra* sp.,  
<sup>4</sup> *Myzus persicae*  
<sup>5</sup> *Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*  
<sup>6</sup> *Anthonomus rubi*



|                                | FILL IN                      |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | SWEDEN                       | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11016904                     | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | VERIMARK_500ML_SE            | Booklet                   | 190/185 x 95 mm  |
| Label SKU                      | 22067340                     | Number of pages (Booklet) | 8 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-F_500ML_VERIMARK_SE_1 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) |                              | Preprinted Material       |                  |

Löss, trips, skalbaggar:

För att få bäst effekt av Verimark® ska behandlingen göras så snart de första skadegörarna upptäcks på grödan, innan de första skadorna på blad eller frukter syns. Upprepa efter 7 till 10 dagar beroende på skadegörartrycket.

Frilevande fjärilslarver:

För att få bäst effekt av Verimark® rekommenderas det att göra en förebyggande behandling vid begynnande äggläggning, innan äggen kläcks och innan de första skadorna kan ses på blad och frukter. Upprepa efter 7 till 10 dagar beroende på skadegörartrycket.

**Färska bönor med balja**

| Skadegörare                                                                                                                                 | Dos                                                                  | Användningstidpunkt (BBCH)                                | Antal behandlingar                        | Karenstid | Övriga villkor                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Vita flygare <sup>1</sup><br>Frilevande fjärilslarver <sup>2</sup><br>Minerarflugor <sup>3</sup><br>Löss <sup>4</sup><br>Trips <sup>5</sup> | Från 375 mL upp till 500 mL/ha beroende på grödans tillväxthastighet | Från BBCH 12 (från 2 örtblad) till BBCH 89 (full mognad). | Max 2 per år med minst 7 dagars intervall | 1 dag     | Endast i droppbevattning. Endast i växthus med slutet, recirkulerande system. |

<sup>1</sup> *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*

<sup>2</sup> *Autographa gamma*, *Chrysodeixis chalcites*, *Helicoverpa armigera*, *Spodoptera exigua*, *Spodoptera littoralis*, *Mamestra* sp., *Ostrinia* sp.

<sup>3</sup> *Liriomyza* sp.

<sup>4</sup> *Aphis gossypii*

<sup>5</sup> *Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*

Vita flygare, minerarflugor, löss, trips:

För att få bäst effekt av Verimark® ska behandlingen göras så snart de första skadegörarna upptäcks på grödan, innan de första skadorna på blad eller baljor syns. Upprepa efter 7 till 10 dagar beroende på skadegörartrycket.

Frilevande fjärilslarver:

För att få bäst effekt av Verimark® rekommenderas det att göra en förebyggande behandling vid begynnande äggläggning, innan äggen kläcks och innan de första skadorna kan ses på blad och baljor. Upprepa efter 7 till 10 dagar beroende på skadegörartrycket.



|                                | FILL IN                      |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | SWEDEN                       | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11016904                     | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | VERIMARK_500ML_SE            | Booklet                   | 190/185 x 95 mm  |
| Label SKU                      | 22067340                     | Number of pages (Booklet) | 8 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-F_500ML_VERIMARK_SE_1 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) |                              | Preprinted Material       |                  |

**Sallat och sallatsväxter**

| Skadegörare                           | Dos                                                                              | Användningstidpunkt (BBCH)                                | Antal behandlingar                            | Karenstid | Övriga villkor                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frilevande fjärilslarver <sup>2</sup> | Från 375 mL upp till 500 mL/ha beroende på grödans tillväxthastighet och storlek | Från BBCH 12 (från 2 örtblad) till BBCH 89 (full mognad). | Max 3 per gröda* med minst 7 dagars intervall | 1 dag     | Endast i droppbevattning eller hydroponisk odling. Endast i växthus med slutet, recirkulerande system.<br>* Totala maximala dosen får inte överskrida 300 g cyantraniliprol/ha och år. Det motsvarar maximalt 1500 mL Verimark <sup>®</sup> per ha och år. |

<sup>2</sup> *Autographa gamma*, *Chrysodeixis chalcites*, *Helicoverpa armigera*, *Spodoptera exigua*, *Spodoptera littoralis*, *Mamestra* sp., *Agrotis ipsilon*

Frilevande fjärilslarver:

För att få bäst effekt av Verimark<sup>®</sup> rekommenderas det att göra en förebyggande behandling vid begynnande äggläggning, innan äggen kläcks och innan de första skadorna kan ses. Upprepa efter 7 till 10 dagar beroende på skadegörartrycket.

**Skyddsutrustning**

Se också närmare anvisningar i produktens säkerhetsdatablad.

Ögonskydd: Tättslutande skyddsglasögon

Handskydd: Kemikaliebeständiga skyddshandskar såsom barriär laminat, butylgummi eller nitrilgummi

Kroppsskydd: Heltäckande skyddskläder, gummi förkläde, gummistövlar av nitrilgummi

Andningsskydd: Andningsskydd med godkänt filter

Allmänna hygienåtgärder: Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Avstå från mat, dryck, rökning och snusning vid arbetet. Får ej komma i kontakt med livsmedel eller djurfoder. Ta av nedsmutsade kläder. Förvara skyddsutrustning separat. Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten. Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspassets slut. Byt ut skadad skyddsutrustning.

**Blandningar**

Blandningarna ska utföras i enlighet med gällande föreskrifter.

Det rekommenderas att inte blanda Verimark<sup>®</sup> med andra produkter. Eventuella blandningar görs på användarens eget ansvar och risk.



|                                | FILL IN                      |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | SWEDEN                       | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11016904                     | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | VERIMARK_500ML_SE            | Booklet                   | 190/185 x 95 mm  |
| Label SKU                      | 22067340                     | Number of pages (Booklet) | 8 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-F_500ML_VERIMARK_SE_1 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) |                              | Preprinted Material       |                  |

### Beredning av brukslösning

Verimark® måste användas i en lösning med ett pH-värde under 7. Om pH-värdet i vattnet som används är högre, rekommenderas att ett surhetsreglerande medel används för att justera lösningens pH.

Börja alltid arbetet med rengjord utrustning. Finns beläggningar eller rester kvar från tidigare behandlingar, rengörs utrustningen med All Clear® Extra innan du börjar fylla tanken. Fyll tanken till minst en fjärdedel med rent vatten och håll därefter långsamt i önskad mängd Verimark®, samtidigt som omrörningen pågår. Tillsätt resten av vattnet och fortsätt röra tills behandlingen är avslutad. Omrörning ska ske med mekaniska eller hydrauliska hjälpmedel. Använd inte bubbel- eller luftsystem.

Applicera brukslösningen omedelbart och senast inom 8 timmar efter blandning. Det rekommenderas inte att förvara den färdiga brukslösningen över natten.

### Hantering av bottensats, sköljvatten och rengöring av utrustning

Rengör utrustningen efter avslutad behandling och hantera sköljvattnet enligt gällande bestämmelser.

#### Rengöring av utrustning

Efter avslutad behandling med Verimark® ska all utrustning (tank och rör) sköljas med rent vatten. Bottensatsen i tanken ska spädas ut genom att, vid sköljning, tillsätta en volym vatten som är minst 5 gånger större än volymen av bottensatsen. Sköljvattnet från tankbotten körs ut på området som just har behandlats med Verimark®. Var noga med att säkerställa att den totala dosen av Verimark® som appliceras, inklusive resterna från tankrengöring och bottensats, inte överstiger den maximala tillåtna dosen för den aktuella grödan.

**I samtliga fall måste rengöring av utrustning och omhändertagande av spillvatten utföras i enlighet med gällande lagstiftning.**

Förhindra förorening av dammar, brunnar, vattendrag, grundvatten, dricksvatten och alla andra vattenmiljöer med produkten, brukslösningen samt sköljvattnet från förpackningar och behandlingsutrustning. Rengör skyddsutrustningen och tvätta händerna.

### Vid ett oavsiktligt spill

Ta på personlig skyddsutrustning och säkra området. Informera brandkåren (112) vid omedelbar fara för miljön som du inte kan hantera på egen hand. Samla upp allt som kan ha kommit i kontakt med produkten, inklusive förorenad jord. Rengör platsen och den utrustning som använts och se till att vatten från rengöringen inte läcker ut. Bortskaffa spill och förorenat material enligt gällande föreskrifter.

### Tomemballage

Tom förpackning får inte återanvändas. Preparatresten och förbrukade, ej rengjorda förpackningar är farligt avfall och ska lämnas för destruktion. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning för information om avfallshantering. Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hålls i spruttanken och används vid bekämpningen. Rengjorda förpackningar lämnas till SvegReturs samlingsplatser enligt information på [www.svepretur.se](http://www.svepretur.se).

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvegReturs återvinningscentral eller annan samlingsplats i kommunen. FMC Agricultural Solutions A/S är anslutet till SvegRetur tel 0370-173 85.

### Förvaring

Förvara alltid produkten i försluten originalförpackning. Förvara produkten i ett låst utrymme som uppfyller gällande lagkrav för förvaring av växtskyddsmedel. Utrymmet ska vara väl ventilerat, torrt, svalt, frostfritt och skyddat från höga temperaturer. Förvaras oåtkomligt för barn, åtskilt från livsmedel och foder.



|                                | FILL IN                      |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | SWEDEN                       | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11016904                     | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | VERIMARK_500ML_SE            | Booklet                   | 190/185 x 95 mm  |
| Label SKU                      | 22067340                     | Number of pages (Booklet) | 8 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-F_500ML_VERIMARK_SE_1 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) |                              | Preprinted Material       |                  |

**VARNINGAR**

Respektera de användningsområden, doser, villkor och försiktighetsåtgärder för användning som anges på förpackningen och som har fastställts i enlighet med produktens egenskaper och hur den ska användas. På denna grund ska odling och behandlingar utföras enligt god jordbrukssed, med beaktande av, på eget ansvar, alla specifika faktorer som rör din gård, såsom jordens beskaffenhet, väderförhållanden, odlingsmetoder, sorter och resistens. Tillverkaren garanterar kvaliteten på sina produkter som säljs och förvaras i originalförpackning. Verimark® ska endast användas i enlighet med rekommendationerna på denna etikett. FMC ansvarar inte för förlust eller skada orsakad av användning som inte överensstämmer med dessa rekommendationer. Användaren tar all risk i samband med användning som inte följer dessa rekommendationer.

BLACK



|                                | FILL IN                      |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | SWEDEN                       | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11016904                     | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | VERIMARK_500ML_SE            | Booklet                   | 190/185 x 95 mm  |
| Label SKU                      | 22067340                     | Number of pages (Booklet) | 8 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-F_500ML_VERIMARK_SE_1 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) |                              | Preprinted Material       |                  |